



ON L'A FAIT!

**Le test de dépistage VIH :
les réponses à toutes vos questions !**

Les questions sont colorées suivant le thème abordé

QUESTIONS GÉNÉRALES


QUESTIONS SUR LES RELATIONS SEXUELLES

QUESTIONS SUR LES DROGUES

QUESTIONS SUR LE TEST DE DÉPISTAGE

éditeur : HIVberodung Croix-Rouge/www.sida.lu
Ministère de la Santé/www.sante.lu
Edition 2015

ISBN 978-99959-41-03-1



L'infection au VIH -Virus de l'Immunodéficience Humaine- diminue les défenses immunitaires du corps, ce qui favorise la survenue de maladies qui peuvent être très graves. Chaque année au Luxembourg, près de 100 personnes sont dépistées positives à cette infection. Pour elles, la mise en place d'un suivi médical est nécessaire. Ce suivi permet à la personne d'avoir une meilleure qualité de vie et surtout, évite l'apparition de maladies opportunistes.

Le Comité National de Surveillance du Sida estime qu'entre 300 et 400 personnes vivent au Luxembourg avec le VIH et ne le savent pas ! Ce qui met en danger leur vie, mais augmente également le risque de transmission de ce virus ! Le seul moyen de savoir si une personne est porteuse du VIH, c'est de faire ce qu'on appelle un test de dépistage.

QU'EST CE QUE LE TEST DE DÉPISTAGE VIH ?

Le test de dépistage est un moyen simple, sûr et efficace qui permet de détecter une infection au VIH. Ce test, réalisé par analyse sanguine, détecte la présence d'anticorps anti VIH dans le sang. Ces anticorps sont produits par l'organisme au plus tôt 2 semaines après une infection au VIH et au plus tard 12 semaines après l'infection !

Un résultat négatif à un test de dépistage n'est fiable à 100% que passé un délai de 12 semaines après une situation à risque, à condition de ne pas avoir vécu une nouvelle situation à risque endéans ce délai et d'avoir utilisé un préservatif pendant ces 12 semaines !

SÉROPOSITIF, SÉRONÉGATIF QU'EST-CE QUE CELA VEUT DIRE EXACTEMENT ?



Si le résultat est « **positif** », cela veut dire que le test a détecté la présence d'anticorps anti-VIH. La personne est **séropositive**, porteuse du VIH. Il est dès lors très important d'aller consulter un médecin spécialiste pour bénéficier d'une prise en charge médicale et, si nécessaire, d'un traitement antirétroviral. En préservant sa santé, il est aujourd'hui possible de vivre longtemps avec le VIH.

Un résultat « **indéterminé** » ou « partiellement positif » peut être dû à la présence d'une autre maladie ou à une exposition au VIH très récente. Il est nécessaire d'en parler avec un médecin et de faire un 2^e test de dépistage.

Si le résultat est « **négatif** » et que le test a été réalisé 12 semaines (ou plus de 12 semaines) après la prise de risque, vous êtes certain de ne pas avoir contracté le VIH lors de ce risque. Un résultat « négatif » signifie que le test n'a pas détecté d'anticorps anti-VIH, autrement dit qu'il n'y a pas eu d'infection. La personne est **séronégative**.

Tout test indéterminé ou positif doit être impérativement répété sur un deuxième échantillon de sang afin d'être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur d'étiquetage ou de manipulation. C'est seulement après ce deuxième test que l'on peut dire à un patient qu'il est porteur du virus ou non.

QUI EST CONCERNÉ PAR LE TEST DE DÉPISTAGE ?



Toute personne ayant au moins une fois dans sa vie vécu une exposition potentielle au virus VIH. Pour rappel, une exposition au virus englobe toute situation où un liquide susceptible de contenir du virus (sang, sperme, sécrétions vaginales, lait maternel) entre en contact avec une entrée du corps (plaie ouverte et/ou muqueuse : vaginale, anale, buccale, nasale, oculaire et gland du pénis).

QUAND FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE ?

12 semaines après la situation à risque. Il n'y a qu'à partir de ce délai que le résultat d'un test VIH est fiable à 100% car c'est le temps qu'il faut à l'organisme pour fabriquer des anticorps contre le VIH après l'infection.

Après 12 semaines, le résultat d'un test VIH est fiable : un résultat « négatif » signifie que le test n'a pas détecté de tels anticorps, autrement dit qu'il n'y a pas eu d'infection. Un résultat « positif » signifie par contre que le test a détecté des anticorps anti-VIH et qu'il y a une infection au VIH.

Si vous faites le test avant l'échéance du délai d'attente de 12 semaines, il se peut que ce soit trop tôt : un résultat [encore] négatif pourrait en fait s'avérer positif lors d'un test ultérieur. La fiabilité du résultat après 4 semaines est déjà de l'ordre de 85% mais le résultat ne pourra être fiable à 100% qu'après 12 semaines.

Dans un délai de 72 heures après la situation à risque, vous avez encore la possibilité, en concertation avec un médecin, de suivre un traitement d'urgence appelé PEP (Prophylaxie Post Exposition). Faire un test endéans ce délai vous permettra également de prouver (ou non) une séronégativité avant la prise de risque.

C'est pendant la primo-infection (période qui se situe entre 15 jours et 12 semaines après la contamination) que le risque de transmettre le VIH est le plus élevé.

J'AI EU UN RAPPORT NON PROTÉGÉ IL Y A 2-3 SEMAINES ET DEPUIS QUELQUES JOURS, J'AI DE LA FIÈVRE, MAL À LA GORGE ET DES ROUGEURS SUR LA PEAU. DOIS-JE FAIRE UN TEST VIH ?

OUI ! La majorité des personnes présente des symptômes tels que fièvre, maux de gorge, rougeurs de la peau durant la phase de séroconversion (quand l'organisme commence à fabriquer des défenses face au VIH). Un test de recherche d'antigène pourrait déjà s'avérer positif à ce moment là. **ATTENTION ! C'est durant cette période de séroconversion que le risque de transmission est le plus élevé !** Il est donc primordial d'utiliser le préservatif après un rapport non protégé tant que l'on n'est pas sûr du résultat du test. Si le résultat est négatif, un 2^e test doit être réalisé 12 semaines après la situation à risque afin de donner un résultat fiable à 100%.

JE SUIS CÉLIBATAIRE ET J'AI FRÉQUEMMENT DES AVENTURES SANS LENDEMAIN, DOIS-JE FAIRE UN TEST ?

Si vous n'utilisez pas le préservatif à chaque rapport sexuel et que vous avez plusieurs partenaires différent(e)s pendant l'année, il est recommandé de faire un test de dépistage tous les 3 mois.

Par contre si vous êtes un inconditionnel du préservatif, un test de dépistage par an suffit.



—
**LISTE DES CENTRES
DE DÉPISTAGE
SUR LA PAGE 19**
—

MON COMPAGNON/ MA COMPAGNE ET MOI-MÊME SOMMES EN COUPLE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES ET TOTALEMENT FIDÈLES, QUEL INTÉRÊT AVONS-NOUS À FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE ?

Faire un test de dépistage vous donne une information sur votre statut sérologique. Si vous n'avez jamais fait de test de dépistage, nous vous conseillons d'en faire un.

L'infection au VIH peut ne montrer aucun symptôme durant plusieurs années ! C'est pourquoi il est important de se tester même si on est dans une relation amoureuse et fidèle !

J'AI EU UN RAPPORT SEXUEL NON PROTÉGÉ AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE QUI AVAIT L'AIR EN BONNE SANTÉ, DOIS-JE QUAND MÊME FAIRE UN TEST ?

BIEN SÛR ! L'infection au VIH ne présente pas de symptômes particuliers, de nombreuses personnes séropositives ne connaissent pas leur statut et ne se font pas dépister car elles se sentent en bonne santé. Il est important de faire un test de dépistage dès que l'on a eu un rapport non protégé. Même si dans certains cas les anticorps anti-VIH se détectent déjà après quelques semaines, seul un test fait 12 semaines après le rapport à risque présente un résultat fiable à 100% à condition de ne pas avoir vécu une nouvelle situation à risque endéans ce délai et d'avoir utilisé un préservatif pendant ces 12 semaines !

JE SUIS GAY ET J'AI ENTENDU DIRE QUE SI J'AI DES PARTENAIRES DIFFÉRENTS, IL FALLAIT QUE JE ME FASSE TESTER RÉGULIÈREMENT, EST-CE VRAI ?



TOUT À FAIT ! Malheureusement un grand nombre de personnes séropositives ne savent pas qu'elles sont infectées et

le risque de s'infecter lors de rapports sexuels sans préservatif entre 2 hommes est très grand. Il est important d'utiliser le préservatif lors de rapports anaux et de fellation et il reste conseillé de faire des tests régulièrement, par exemple tous les 3 mois. De plus, il est important de se faire dépister pour d'autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST) telles que la gonorrhée, l'infection à chlamydia, la syphilis et l'Hépatite C.

JE DOUTE DE LA FIDÉLITÉ DE MA COMPAGNE/ DE MON COMPAGNON ? EST-CE QU'UN TEST M'EST UTILE ?

Un test vous indiquera votre statut sérologique, positif ou négatif, mais il ne vous prouvera pas une infidélité de votre partenaire.

MON COMPAGNON/MA COMPAGNE M'A AVOUÉ AVOIR EU UNE AVENTURE, NOUS NOUS POSONS DES QUESTIONS QUANT À NOTRE SANTÉ, QUE DEVONS NOUS FAIRE ?

Si votre compagnon/compagne ne s'est pas protégé(e), il est important que vous vous fassiez dépister tous les deux et ce, 12 semaines après la situation à risque. De plus, afin d'être également certain de ne pas avoir contracté d'autres infections sexuellement transmissibles (IST), il est important de faire un dépistage pour celles-ci. Par exemple, l'infection à chlamydia, la gonorrhée, la syphilis ou encore l'herpès sont les plus fréquentes. Le mieux est de demander à un médecin un bilan complet pour les IST.

MA COPINE/MON COPAIN ET MOI SOMMES ENSEMBLE DEPUIS QUELQUES MOIS ET NOUS UTILISONS LE PRÉSERVATIF, EST-CE QUE LE TEST DE DÉPISTAGE NOUS PERMETTRA DE RENONCER AU PRÉSERVATIF ?

OUI ! Dès que vous aurez reçu les résultats de vos tests respectifs, que ceux-ci sont négatifs et que vous restez fidèles l'un à l'autre ! N'oubliez pas qu'un test n'est fiable à 100% que si vous n'avez pas eu de situations à risque pendant les 12 semaines précédant le test !



J'AI ÉTÉ VIOLÉ(E) OU ABUSÉ(E) SEXUELLEMENT, DOIS-JE FAIRE UN TEST ?

IL EST IMPÉRATIF QUE VOUS FASSIEZ UN TEST ! Si votre agression sexuelle/viol a eu lieu il y a moins de 72h, vous devez absolument vous rendre au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) ou dans tout autre service d'urgences hospitalières afin de voir un médecin qui vous prescrira un traitement d'urgence contre le VIH (PEP) et vous fera un test de dépistage pour le VIH et autres Infections Sexuellement Transmissibles. Ce test définira votre statut sérologique lors de l'agression et il faudra refaire un test 12 semaines après l'agression sexuelle ou le viol pour savoir si vous avez été infecté(e) ou non.

En cas de viol, n'hésitez pas à contacter les secours (112) et la police (113) pour recevoir les informations et le soutien nécessaires.

JE ME SUIS RÉVEILLÉ(E) SANS ME RAPPELER DE TOUS LES DÉTAILS D'HIER...

Faire un test vous informe sur votre statut sérologique, cependant il faut attendre 12 semaines après cette soirée pour refaire un test afin de savoir si vous avez été infecté(e) ou non.




IL M'ARRIVE DE SNIFFER DE LA COCAÏNE ET J'AI ENTENDU DIRE QU'IL POUVAIT Y AVOIR UN RISQUE DE TRANSMISSION, DOIS-JE FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE ?

Le risque de transmission du VIH en sniffant de la cocaïne ou tout autre substance est minime, par contre, le risque est bien réel en ce qui concerne la transmission du virus de l'hépatite C s'il y a eu échange de « paille ».

JE ME SUIS DÉJÀ INJECTÉ DE L'HÉROÏNE, DOIS-JE FAIRE UN TEST ?

OUI ! Surtout si vous avez utilisé la seringue d'un/e autre ! N'oubliez pas qu'en plus du VIH, le virus de l'hépatite C se transmet très facilement par le sang et donc lors d'échanges de seringue.

L'hépatite C se détecte par prise de sang 12 semaines après la contamination. Si vous avez utilisé du matériel appartenant à une autre personne pour sniffier ou vous injecter des drogues, consultez votre médecin afin qu'il vous prescrive un test de dépistage pour l'hépatite C. Il est également possible de faire un test de dépistage rapide pour l'hépatite C dans le DIMPS (voir lieux et horaires de passage du Dimps sur sida.lu ou dimps.lu).



JE ME SUIS MALENCONTREUSEMENT PIQUÉ(E) AVEC UNE SERINGUE USAGÉE QUE DOIS-JE FAIRE ?

questions **14** réponses

Si vous vous êtes piqué(e) accidentellement avec une seringue usagée et que moins de 72 heures se sont écoulées, vous devez vous rendre immédiatement au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) ou dans tout autre service d'urgences pour y recevoir un traitement d'urgence (la PEP). Un premier test VIH sera réalisé et le médecin vous prescrira ce traitement d'urgence qui consiste en la prise de 3 comprimés 2 fois par jour pendant 1 mois. Attention, plus ce traitement est débuté tôt après l'accident, plus son efficacité est grande !

Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous rendre au CHL ou dans un autre service d'urgences dans les 72 heures, vous devrez faire un test passé le délai de 12 semaines pour savoir si vous avez été infecté(e) ou non.

Si moins de 72 heures se sont écoulées après la situation à risque, rendez-vous le plus rapidement possible dans un service d'urgences hospitalières afin d'y recevoir un traitement d'urgence (PEP).

JE SUIS ENCEINTE ET MON GYNÉCOLOGUE M'A PRESCRIT UN TEST DE DÉPISTAGE, POURQUOI ?

Le test de dépistage lors de la grossesse a pour but de protéger le bébé en cas d'une infection au VIH de la maman. Aujourd'hui, grâce aux traitements antirétroviraux contre le VIH, la transmis-

sion du virus de la maman au bébé peut être évitée ! Si la maman est dépistée positive au VIH lors de sa grossesse, elle reçoit un traitement qui a pour but de réduire la quantité de virus dans son sang, ce qui diminue le risque de transmission au bébé. Une fois né, le bébé prendra encore un traitement pendant 1 mois ce qui le protège des virus qui sont entrés dans son corps lors de l'accouchement. Grâce à ce traitement, la transmission de la mère à l'enfant est presque inexistante au Luxembourg !



Les mamans VIH+ ne peuvent pas allaiter leurs bébés car le lait maternel contient également beaucoup de virus !

LE PRÉSERVATIF S'EST DÉCHIRÉ ET JE NE SAIS PAS SI MON/MA PARTENAIRE EST POSITIF OU NON, QUE DOIS-JE FAIRE ?



Si moins de 72h se sont écoulées depuis la prise de risque (rupture de préservatif), vous devez vous rendre immédiatement au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) ou dans tout autre service d'urgences pour y rencontrer un médecin qui évaluera le risque de transmission et vous prescrira éventuellement un traitement d'urgence (la PEP). Un premier test VIH sera réalisé et, si le médecin le juge utile, il vous prescrira ce traitement d'urgence qui consiste en la prise de 3 comprimés 2 fois par jour pendant 1 mois. Attention, plus ce traitement est commencé tôt, plus son efficacité est grande ! Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous rendre au CHL ou dans un autre service d'urgences endéans les 72 heures, vous devrez faire un test passé le délai de 12 semaines pour savoir si vous avez été infecté(e) ou non lors de cette situation à risque.



La PEP n'est pas comparable à la pilule du lendemain et comporte de nombreux effets secondaires ! En aucun cas le traitement d'urgence peut se substituer à l'utilisation du préservatif !

JE SUIS SÉRONÉGATIF/VE, EST-CE QUE CELA VEUT DIRE QUE JE SUIS PROTÉGÉ(E) CONTRE LE VIH ?

NON ! Être séronégatif/ve signifie que le résultat du test est négatif c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anticorps anti-VIH dans le sang, donc pas d'infection.


En aucun cas, un résultat négatif ne protège d'une infection !

PEUT-ON FAIRE PLUSIEURS TESTS PAR AN ?

OUI ! Faire 1 test tous les 3 mois si on estime avoir plusieurs prises de risque par an est tout à fait recommandable. Éviter la prise de risque et/ou utiliser systématiquement un préservatif, c'est mieux.

FAUT-IL ÊTRE À JEUN POUR FAIRE LE TEST DE DÉPISTAGE ?

NON, pas besoin d'être à jeun pour le test de dépistage VIH.



A close-up photograph of a woman with reddish-brown hair, smiling warmly. She is holding a white ceramic cup. In the foreground, another white cup is partially visible, held by a hand. The background is softly blurred, showing vertical lines and warm, golden light, suggesting an indoor setting like a cafe or a community center. The overall mood is positive and inviting.

—
**LISTE DES CENTRES
DE DÉPISTAGE
SUR LA PAGE 19**
—

OÙ DOIS-JE ALLER POUR FAIRE MON TEST DE DÉPISTAGE ?

Test « classique » :

- Chez votre médecin traitant qui vous prescrira une ordonnance avec laquelle vous pourrez aller dans n'importe quel laboratoire du pays ou hôpital...
- Dans un centre de dépistage anonyme et gratuit (CHL, ZITHA KLINIK, HK, CHEM, CHDN, LNS voir adresses et horaires en fin de brochure)

Votre résultat vous sera communiqué quelques jours plus tard. Les tests de dépistage de dernière génération permettent d'obtenir un résultat fiable 12 semaines après la dernière prise de risque.

Test « rapide », anonyme et gratuit

- HIVberodung Croix-Rouge
94, Bvd du Général Patton
L-2316 Luxembourg
T : 2755 4500

Les lundis et mercredis de 17h à 19h

...ET SI JE VEUX RESTER ANONYME ?

7 sites offrent des tests de dépistage anonymes et gratuits :

À Luxembourg-Ville :

– Centre Hospitalier (CHL)
Service des Maladies
Infectieuses (2^e étage)
4, rue Barblé
L-1210 Luxembourg
jours ouvrables de 7 à 15h
www.chl.lu

– Zitha Klinik
36, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg
jours ouvrables de 11 à 18h
www.zitha.lu

– Hôpital Kirchberg
9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
jours ouvrables de 7 à 19h
samedi de 7 à 10h
www.hkb.lu

– HIVberodung Croix-Rouge
(tests rapides)
94 Bvd du Général Patton
L-2316 Luxembourg
T : 2755 4500
Les lundis et mercredis de
17h à 19h
www.aids.lu
www.sida.lu

À Esch/Alzette :

– Centre Hospitalier
Emile Mayrisch
rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch/Alzette
jours ouvrables de 7 à 17h
www.chem.lu

À Ettelbrück :

– Centre Hospitalier du Nord - St Louis
120, Avenue Lucien Salentyng
L-9080 Ettelbrück
jours ouvrables de 10 à 14h
www.chdn.lu

À Dudelange :

– LNS
(Laboratoire National de Santé)
1, Rue Louis Rech
L-3555 Dudelange
jours ouvrables
de 7h30 à 16h
www.lns.lu

Après la prise de sang, un numéro vous sera remis et vous viendrez chercher votre résultat muni de ce numéro deux à trois jours plus tard. Vous recevrez le résultat oralement. Comme le test est anonyme, aucun document attestant que vous êtes séronégatif(ve) ou séropositif(ve) ne vous sera remis.

COMMENT SE DÉROULE UN TEST DE DÉPISTAGE ?

Le test de dépistage consiste en une simple prise de sang. Le sang est ensuite analysé au laboratoire. Dans le cas d'un test rapide, il faut prélever une goutte de sang à l'extrémité du doigt et cette goutte est ensuite mélangée à un réactif.

Faire un test rapide signifie que le résultat est obtenu rapidement après la prise de sang et non pas que le test est fiable si le délai est inférieur à 12 semaines après une prise de risque! Tout test rapide qui montre un résultat indéterminé ou positif nécessite une prise de sang pour une analyse plus approfondie.

OÙ PUIS-JE FAIRE UN TEST RAPIDE ?

Les tests rapides sont proposés à l'HIVberodung les lundis et mercredis de 17h à 19h ainsi que dans le DIMPS (Dispositif d'Intervention Mobile pour la Promotion de la Santé sexuelle). Les lieux et horaires de passage du DIMPS sont consultables sur le site www.dimps.lu.



LES TESTS RAPIDES VENDUS SUR INTERNET SONT-ILS FIABLES ?

Les pays de la Communauté Européenne n'ont pas donné l'autorisation pour la vente et l'achat de tests par internet. Il est fortement déconseillé d'acheter un test rapide de dépistage VIH sur internet. Tout d'abord, leur fiabilité n'est pas prouvée, ensuite, faire un test de dépistage n'est pas un geste anodin, la lecture des résultats nécessite l'encadrement de personnes qualifiées afin d'interpréter correctement le test. Si vous souhaitez faire un test rapide, adressez-vous au service HIVberodung où vous bénéficierez d'un conseil personnalisé.

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE ATTENDRE POUR AVOIR LES RÉSULTATS DE MON TEST ?

En général, les résultats sont disponibles au plus tard 3 jours ouvrables après avoir fait le test.

DOIS-JE PAYER POUR UN TEST VIH ?

NON, le test de dépistage est gratuit, il est entièrement pris en charge par la Caisse Nationale de Santé, ou, en cas d'anonymat, par le Ministère de la Santé.

— PUIS-JE FAIRE UN TEST ALORS QUE JE SUIS MINEUR ? —

OUI, il n'y a pas d'âge légal pour faire un test de dépistage. Toutefois, il est important de savoir que les professionnels sont tenus de respecter le secret professionnel pour autant que le mineur ne se mette pas en danger. En cas de résultat positif et de suivi médical nécessaire, le médecin peut te proposer de t'aider à informer tes parents.

— MON MÉDECIN ME PRESCRIT RÉGULIÈREMENT DES ANALYSES SANGUINES, JE SUPPOSE QUE LE TEST VIH EST INCLUS AUTOMATIQUEMENT DEDANS ? —

NON, le test de dépistage VIH n'est pas systématiquement réalisé lors d'analyses sanguines, si l'on souhaite être dépisté, il faut le préciser.


Un médecin ne peut pas vous prescrire un test VIH sans votre consentement préalable !

PEUT-ON M'OBLIGER DE FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE ?

NON, légalement personne ne peut vous obliger à faire un test de dépistage VIH. Il faut cependant savoir que la majorité des sociétés d'assurance-vie demandent un test de dépistage pour évaluer le montant de la prime d'assurance. En cas de séropositivité, elles peuvent refuser l'assurance vie ou l'accepter en augmentant le prix de la prime à payer.

MON/MA PARTENAIRE M'A MONTRÉ SES RÉSULTATS D'ANALYSE ET ILS SONT NÉGATIFS, PUIS-JE LUI FAIRE CONFIANCE ?

Les résultats d'analyse de votre partenaire ne sont fiables que si vous êtes certain(e) qu'il/elle n'a pas vécu de situation à risque durant les 12 semaines précédant son test, mais également entre le moment de son test et le moment où il/elle vous montre le résultat de ce test.



LEXIQUE

Anticorps : fabriqués par les globules blancs, les anticorps sont la réponse du système immunitaire à une infection. De façon imagée, nous pouvons les comparer à des armes fabriquées pour lutter contre telle ou telle infection.

Antigènes : les antigènes sont des substances étrangères à l'organisme qui vont entraîner une réaction du système immunitaire comme la fabrication d'anticorps.

IST : Infection Sexuellement Transmissible : infection, ne présentant souvent pas de symptômes, pouvant se transmettre lors de rapports et/ou de caresses sexuels. Par exemple, la gonorrhée, l'infection à chlamydia, la syphilis, l'herpès.

PEP : Prophylaxie Post Exposition : traitement d'urgence donné après une exposition éventuelle au virus VIH. Le traitement d'urgence n'est efficace que s'il est initié dans un délai maximum de 72 heures après la prise de risque.

Système Immunitaire : système de défense de l'organisme face aux diverses infections, bactéries, microbes, virus, parasites etc.

VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine

VHC : Virus de l'Hépatite C : le virus de l'Hépatite C se transmet par le sang. Les situations à risque de transmission sont le plus souvent : le partage de matériel d'injection de drogue par voie intraveineuse, le partage de matériel de sniff et la pénétration anale.

ADRESSES UTILES

HIVBerodung - Croix-Rouge

94, bvd. Patton
L-2316 Luxembourg
T. 2755 4500
*Dépistage les lundis et
mercredis de 17h à 19h*
www.aids.lu
www.sida.lu

Stop Aids Now/Acces

c/o HIVberodung - Croix-
Rouge
94, Bvd Patton
L-2316 Luxembourg
T. 406 251
www.sida.lu

Centre Hospitalier (CHL)

Service des Maladies
Infectieuses (2^e étage)
4, rue Barblé
L-1210 Luxembourg
*Dépistage tous les
jours ouvrables de
7 à 15h*
www.chl.lu

Hôpital Kirchberg

9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
*Dépistage tous les
jours ouvrables
de 7 à 19h
Samedi de 7 à 10h*
www.hkb.lu

Zitha Klinik

36, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg
*Dépistage tous les
jours ouvrables de
11 à 18h*
www.zitha.lu

Centre Hospitalier Emile Mayrisch

rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch/Alzette
*Dépistage tous les
jours ouvrables de
7 à 17h*
www.chem.lu

Centre Hospitalier du Nord - St Louis

120, Avenue Lucien
Salentyng
L-9080 Ettelbrück
*Dépistage tous les
jours ouvrables de
10 à 14h*
www.chdn.lu

LNS

(Laboratoire National
de Santé)
1, rue Louis Rech
L-3555 Dudelange
*Dépistage tous les jours
ouvrables de 7h³⁰ à 16h*
T. 281 001
www.lns.lu

DIMPS

(Dispositif d'Interven-
tion Mobile pour la
Promotion de la Santé
sexuelle)
www.dimps.lu pour
connaître les horaires
et lieux de passage
du Dimps.

Ministère de la Santé

Direction de la Santé
Division de la Médecine
Préventive et Sociale
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
www.sante.lu

Laboratoires

Ketter-Thill
T. 488 288 1
www.llam.lu

Laboratoires Forges du Sud

T. 518 058
www.labtalon.lu

Laboratoires Réunis

T. 780 290 1
www.labo.lu



WWW.S



SIDA.LU



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Direction de la santé

croix-rouge 
luxembourgeoise
Santé **HIV Berodung**
Hépatites, IST et VIH



STOPAIDSNOWACCES
action de coopération pour l'environnement et la santé

www.sida.lu
Sante.lu