

UN DOUTE ? UN RISQUE ?

le seul moyen de savoir
est de faire un dépistage!

ATTENTION

SI LA PRISE DE RISQUE A EU LIEU AVANT 72H,
IL EST POSSIBLE D'AVOIR UN TRAITEMENT
D'URGENCE PEP AFIN DE RÉDUIRE FORTEMENT
LES RISQUES DE CONTAMINATION PAR LE VIH.

En attendant de faire le test
et de pouvoir exclure une infection,
il faut toujours utiliser un préservatif
et protéger son/sa/ses partenaire/s !

LE TEST DE DÉPISTAGE DU VIH EST LE SEUL MOYEN DE CONNAÎTRE SON STATUT SÉROLOGIQUE, DONC DE DÉTECTER UNE INFECTION AU VIH !

Connaître son statut permet de lever
un doute, d'adapter son comporte-
ment et/ou en cas de résultat positif,
d'avoir accès au traitement afin
d'atteindre une charge virale indétect-
able et, dès lors, ne plus transmettre
le VIH lors de rapports sexuels!

DÉPISTAGE PAR ANALYSE SANGUINE :

une prise de sang est réalisée
par un professionnel de santé.

Le dépistage par prise de sang est
fiable 6 semaines après le risque et le
résultat est disponible après quelques
jours.



DÉPISTAGE PAR TESTS RAPIDES D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) :

une goutte de sang est prise
au bout du doigt par un
professionnel de santé.

Le dépistage par TROD est fiable
12 semaines après le risque et la
lecture du résultat se fait après
quelques minutes.



EN VIDÉO :



DÉPISTAGE PAR AUTOTEST :

le prélèvement, la manipulation
et la lecture du résultat sont
réalisés par la personne elle-même.

Le dépistage par autotest est fiable
12 semaines après le risque et la
lecture du résultat se fait après
20 minutes.



UN TEST EST NÉGATIF

Si les délais sont bien respectés,
un test négatif signifie que la personne
est séronégative et n'est pas infectée
par le VIH. Par contre, elle
n'est pas à l'abri d'une infection
future si elle ne se protège pas.

UN TEST POSITIF


Signifie que la personne est séroposi-
tive et donc porteuse du VIH. Elle peut
donc aussi le transmettre. Un test
positif sera toujours suivi d'un test de
confirmation et d'une prise de sang !
En cas de résultat positif, un suivi
médical et une prise de traitement
peuvent être entamés. Au Luxembourg
le service spécialisé est le Service
National des Maladies Infectieuses
du CHL.

SITUATION À RISQUE D'INFECTION AU VIH :

LIQUIDE CORPOREL
+
OUVERTURE CORPORELLE
+
CONTACT
=
RISQUE !

- TOUTES RELATIONS SEXUELLES
NON PROTÉGÉES PAR UN PRÉSERVATIF
- PIQURE ACCIDENTELLE OU NON
AVEC UNE SERINGUE USAGÉE

LE TEST DE DÉPISTAGE



IMPORTANT

LES TESTS DE DÉPISTAGE VIH NE DÉPISTENT
PAS LES AUTRES INFECTIONS SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES TELLES QUE L'HERPÈS,
LA SYPHILIS, LES INFECTIONS À CHLAMYDIA,
LES GONOCOQUES OU LES HÉPATITES VIRALES !!



LIEUX DE DÉPISTAGE

DÉPISTAGE PAR TEST RAPIDE GRATUIT ET ANONYME

HIV BERODUNG

Croix-Rouge luxembourgeoise

94, bvd Général Patton,
Luxembourg
tél. 2755 4500

LUNDIS ET MERCREDIS
de 17h00 à 19h00

CENTRE LGBTIQ+ CIGALE :

16, rue Notre Dame,
Luxembourg (2^e étage)
tél. 26190018

JEUDIS
de 12h30 à 14h30

DIMPS - MOBILE HIV TESTING:

Lieux et horaires sur www.dimps.lu

DÉPISTAGE PAR AUTOTEST

PHARMACIES SUPERMARCHÉS CACTUS

HIV BERODUNG

Croix-Rouge luxembourgeoise
hivberodung@croix-rouge.lu



Trouvez tous les lieux de dépistage
et plus d'infos sur aids.lu

DÉPISTAGE PAR ANALYSE SANGUINE

sans ordonnance, gratuit et anonyme

CHL- SERVICE NATIONAL DES MALADIES INFECTIEUSES

CONSULTATION INFIRMIÈRE IST
tél. 4411-8348

LUNDI - VENDREDI
de 7h30 à 15h à l'Unité 20 au 2^{ème} étage
4, rue Ernest Barblé
L- 1210 Luxembourg

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTÉ

LUNDI - VENDREDI
de 7h30 à 15h30

CENTRE HOSPITALIER EMILE MAYRICH

LUNDI - VENDREDI
de 7h à 17h

croix-rouge
luxembourgeoise



HIV Berodung